



Vigne

Réseau BSV Vigne Charentes Phénologie et Mesure de croissance

➤ Mise en place

- ❖ Choisir et identifier 5 cep dans la parcelle
- ❖ Choisir et identifier 2 rameaux par cep (numérotés de 1 à 10)

Préserver les rameaux de l'écimage :

- attacher les rameaux dans la végétation au fur et à mesure de la pousse
- éviter d'attacher sur le fil de tête ou sur le fil releveur
- ne pas enrouler les rameaux autour du fil
- en cas d'accident (rameau rogné, cassé,...), remplacer par un rameau équivalent

➤ Suivi hebdomadaire (en début de semaine), à partir du débourrement jusqu'à la fin de la croissance de tous les rameaux observés (mi-août en moyenne)

- ❖ Relever le stade phénologique de chaque rameau (selon l'échelle phénologique d'Eichhorn et Lorenz)
 - Jusqu'au stade 17 (Boutons Floraux Séparés) : détermination du stade essentiellement à partir du nombre de feuilles observées
 - A partir de la floraison : détermination du stade en fonction de la grappe.
- ❖ Mesurer la longueur de chaque rameau (en cm) et compter le nombre de feuilles sorties, à partir de la base.
- ❖ En cours de saison, lorsque les rameaux commencent à être longs, des étiquettes intermédiaires peuvent être mises en place (voir avec l'animateur phéno).

➤ Enregistrement des données

- ❖ Remplir le tableau Excel (les cases jaunes uniquement, les autres cases contiennent des formules permettant de faire les moyennes automatiquement).
- ❖ Envoyer le tableau à l'animateur phéno avant le mardi 10h.