



## Vigne

### Guide des observations - Réseau BSV Vigne Mise en place et suivi des pièges alimentaires

Document destiné aux observateurs du réseau BSV Vigne

**Objectifs :** Suivre la dynamique de vol d'eudémis pour optimiser le positionnement des traitements.

**Mode d'action :** Les papillons qui cherchent à se nourrir ou à s'hydrater sont attirés par le jus de pomme et meurent par noyade.



#### Précautions d'utilisation


Conserver le jus de pomme concentré au réfrigérateur pour éviter sa fermentation.



Les pièges doivent être installés avant le début du vol de deuxième génération d'eudémis.

#### Mise en place

- 1) Diluer le jus de pomme : 200 ml de jus pour 800 ml d'eau.
- 2) Pour un piège : remplir 5 pots de jus de pomme et les disposer en croix de Saint André.
- 3) Dans l'idéal, installer 1 dispositif de piègeage pour 10 hectares environ.



#### Niveau du jus de pomme

Compléter au fur et à mesure de l'évaporation (environ une fois par semaine).

#### Saisie des observations (Epicure)

- Durée : **de mi-juin à fin septembre** (fin de la troisième génération).
- Dans l'idéal, noter le nombre d'eudémis capturées **quotidiennement**.
- En cas des relevés non journaliers, répartir le nombre de papillons sur tous les jours de la période.
- Bien **identifier** les eudémis car le piège capturera d'autres espèces.
- Lors des absences, relever les pièges avant de partir et à votre retour **répartir les observations** sur la période correspondante.
- En absence de papillons, **saisir 0**, sinon l'observation n'est pas prise en compte.
- Saisir les données **tous les lundis avant 13h**