



## Vigne

### Guide des observations - Réseau BSV Vigne Mise en place et suivi des pièges sexuels

Document destiné aux observateurs du réseau BSV Vigne

**Objectifs :** Suivre la dynamique de vol des tordeuses mâles pour optimiser le positionnement des traitements.

**Mode d'action :** La capsule de phéromones attire les papillons mâles qui seront collés sur la plaque de glue.



#### Précautions d'utilisation

Conservé les capsules dans le bas du réfrigérateur  
et les manipuler avec des gants



Les pièges doivent être installés avant la date théorique de début de vol, soit pour l'Eudémis quand la somme des températures depuis le 1er février a atteint 565°C.

#### Mise en place

- 1) Installer les cabanes et les plaques engluées.
  - 2) Poser les capsules de phéromones sur la glue : capsule **Lobesia pour Eudémis** et **Eupoecilia pour Cochylys**.
  - 3) Identifier les pièges : « E » pour eudémis, « C » pour cochylys.
  - 4) Installer les pièges sur le fil fixe :
- Le premier piège doit être placé à une distance de **15 ceps** de l'entrée du rang (**côté bois** s'il y a), l'autre piège doit être éloigné **d'au moins 20m** du premier.



#### Renouvellement des capsules

Une capsule couvre une génération.  
La date de changement de capsules est indiquée dans le BSV et par circulaire.

#### Saisie des observations (Epicure)

- Durée : **de mi-avril à fin septembre** (fin de la troisième génération d'Eudémis).
- Dans l'idéal, relever le nombre de tordeuses capturées **quotidiennement**.
- En cas des relevés non journaliers, répartir le nombre de papillons sur tous les jours de la période.
- Lors des absences, relever les pièges avant de partir et à votre retour **répartir les observations** sur la période correspondante.
- En absence de papillons, **saisir 0**, sinon l'observation n'est pas prise en compte.
- Saisir les données **tous les lundis avant 13h**